

Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skirimui
<p>HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė atitinka individualizuotą tikslinę HbA1c reikšmę.</p> <p>HbA1c nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė neatitinka individualizuotos tikslinės HbA1c reikšmės</p>	<p>4 kartus per metus. Tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėn., nuo ankstesnio tyrimo atlikimo. *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai pacientui taikomas nemedikamentinis ar medikamentinis CD gydymas, vadovaujantis cukrinio diabeto ir tarpinės hiperglikemijos diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PSDF.</p>
<p>1. Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas.</p> <p>2. Natriuretinio peptido tyrimo atlikimas, kai nustatytas širdies nepakankamumas.</p>	<p>1 kartą per metus. 1. Esant stabiliai būklei ne daugiau 1 k. per metus. 2. Pablogėjus sergančio ŠN būklei galima atlikti 2 k. per metus. 3. Jei buvo atlikta esant stabiliai būklei 1k., o vėliau būklė pablogėjo, galima papildomai kartoti 2 kartus, bet negalima viršyti 3 kodų per metus. *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai:</p> <p>1. reikia atlikti dusulio diferencinę diagnostiką; 2. kai nustatytas širdies nepakankamumas, esant stabiliai būklei; Skiriama kai: 1. Yra klinikinių dusulio ar kojų tinimo simptomų. Tyrimas atliekamas prieš skiriant ar koreguojant gydymą.</p>
<p>Feritino tyrimo atlikimas</p>	<p>2 kartus per metus. *Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariama ar nustatyta geležies stoka ar anemija (D50 arba E61.1).</p>
<p>Šlapimo pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</p> <p>Šlapimo pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariama ar diagnozuota šlapimo takų infekcija ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo (kodai: N10, N11, N30, N34 ir N39).</p>
<p>Išmatų pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</p> <p>Išmatų pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma.</p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama asmenims, kuriems įtariamas bakterinės kilmės viduriavimas ir turi būti priimamas sprendimas dėl antibakterinio gydymo taikymo.</p>
<p>Žaizdų pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</p> <p>Žaizdų pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, kai reikia priimti sprendimą dėl antibakterinio gydymo taikymo.</p>
<p>Ausies išskyrių pasėlio tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma</p> <p>Ausies išskyrių pasėlio tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	<p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1. Ūminis vidurinės ausies uždegimas ir būgnelio perforacija; 2. Pasikartojantys pūlingi otitai.</p>

Tyrimai, kuriuos galite gauti nemokamai:

Paslauga	Kiek kartų skiriamas	Sąlygos tyrimo skyrimui
<p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai neatliekama antibiotikograma.</p> <p>Pasėlio iš nosiaryklės ir gerklės tyrimas, kai atliekama antibiotikograma</p>	*Jei atitinka sąlygas.	Skiriama, įtariant viršutinių kvėpavimo takų bakterinės kilmės infekciją, jeigu A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno testas yra neigiamas.
Greitojo rota ir adeno viruso ar greitojo rota, adeno ir noro viruso antigeno testo atlikimas (išmatų mėginys)	*Jei atitinka sąlygas.	Įtariant virusinės kilmės viduriavimą.
<p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas, esant Helicobacter pylori infekcijai būdingų simptomų. (Išmatų mėginys)</p> <p>Helicobacter pylori antigeno testo atlikimas po taikyto Helicobacter pylori infekcijos gydymo (Išmatų mėginys)</p>	<p>1 kartą per metus, jei nebuvo diagnozuota infekcija ir nebuvo taikytas gydymas ir atitinka skyrimo sąlygas.</p> <p>Tik po gydymo 1 kartą, ne anksčiau kaip 4 sav. baigus antibiotikus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Skiriama, jei yra bent viena iš Helicobacter pylori infekcijai būdingų sąlygų:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. neaiškios kilmės dispepsija; 2. po skrandžio rezekcijos; 3. jei įtariama ar diagnozuota skrandžio opa, erozija ir jei Helicobacter pylori testas nebuvo atliekamas; <p>Užbaigus Helicobacter pylori infekcijos gydymą.</p>
Vitamino B12 (kobalamino) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą arba nustatyta skrandžio patologija (pvz.: po skrandžio rezekcijos ar mažinimo operacijos).
Vitamino B9 (folinės rūgšties) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>Paskyrus gydymą, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama asmenims, kuriems nustatyta makrocitinė anemija (tyrimas atliekamas, kai vidutinis eritrocitų tūris kraujyje (MCV) viršija normą.
Vitamino D (25-OH) tyrimo atlikimas	<p>Ne daugiau 2 kartus per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	<p>Tyrimas skiriamas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prieš pradėdant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti A sąrašą. Jeigu nustatomas VitD trūkumas, tyrimas kartojamas 1 kartą – ne anksčiau kaip po 2 mėn. nuo gydymo pradžios. 2. tęsiant osteoporozės gydymą vaistiniais preparatais, įrašytais į A sąrašą, tyrimas atliekamas 1 kartą per metus.
Laisvo tiroksino (LT4) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Tyrimas skiriamas, įtariant tirotoksikozę, kai TTH tyrimo rezultatas yra mažesnis nei norma ir atsiranda klinikinių tirotoksikozės (hipertirozės) simptomų.
Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) tyrimo atlikimas	<p>1 kartą per metus.</p> <p>*Jei atitinka sąlygas.</p>	Skiriama, kai TTH tyrimo rezultatas yra didesnis nei norma ir yra hipotirozės požymių.